

# Amyoger<sup>®</sup> film-coated tablets

## Riluzole

### Dosage form and active ingredients:

Each film coated circle tablet contains 50 mg of Riluzole.

### Therapeutic indications:

Amyoger (Riluzole) is indicated to extend life or the time to mechanical ventilation for patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

### Drug Dosage and Administration method:

- The recommended daily dose in adults or older people is 100 mg (50 mg every 12 hours) orally.
- No significant increased benefit can be expected from higher daily doses.
- Treatment with Amyoger should only be initiated by physicians.

### Contraindications:

- Amyoger is contraindicated during hepatic disease.
- Amyoger is contraindicated in pregnancy breast-feeding.
- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
- The drug with fatty food should be avoided.

### Side effects:

If any of the following side effects occur while taking Amyoger, check with your doctor.

Asthenia and Fever, nausea, increased serum alanine aminotransferase, painful urination, nervousness.

### Effects on ability to drive and use machines:

Patients advised not to drive or operate machinery if dizziness and vertigo occurs during Amyoger treatment.

### Storage condition:

- Store below 30 degree centigrade and keep away from direct light, moist and frizzling.
- Keep out of reach of children.
- Don't use expired Amyoger.

### Nature and contents of container:

10 Tablets are packaged in each opaque blister cards and each package contains 20 tablets.

Marketing authorization holder  
Hogerdaroo Danesh Pharmaceutical CO.  
Shahid Beheshti Uni. Technology Incubators  
Tehran, Iran. postal code: 1983969411  
www.hogerdaroo.com

# قرص روکشدار دایره ای آمیوگر<sup>®</sup>

## ریلوزول

### شکل دارویی و میزان مواد موثره:

هر قرص روکشدار دایره ای حاوی ۵۰ میلیگرم ریلوزول میباشد.

### موارد مصرف:

مصرف این دارو در افزایش طول عمر و بهبود وضعیت تهویه مکانیکی بیماران مبتلا به اسکلروز آمیوتروفیک (ALS) موثر است.

### نحوه و مقدار مصرف:

میزان مصرف روزانه توصیه شده در بزرگسالان و افراد پیر (۱۰۰ میلیگرم (۵۰ میلیگرم هر ۱۲ ساعت) بصورت خوراکی میباشد. افزایش دوز مصرف روزانه هیچ تاثیری در نتایج مصرف دارو ندارد. تجویز داروی آمیوگر باید توسط پزشک صورت بگیرد.

### موارد منع مصرف:

- این دارو طی بیماریهای کبدی منع مصرف دارد.
- این دارو در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.
- مصرف این دارو با غذای پرچرب ممنوع است.
- مصرف این دارو در افرادی که نسبت به ریلوزول حساسیت دارند ممنوع است.

### مصرف در زمان رانندگی و کار با ماشین آلات:

رانندگی و کار با ماشین آلات در صورت ایجاد سرگیجه و سایر علائم عصبی طی مصرف آمیوگر توصیه نمیشود.

### عوارض جانبی:

در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر طی مصرف داروی آمیوگر با پزشک خود مشورت کنید. ضعف و تب، تهوع و استفراغ، افزایش مقادیر سرمی آلانین آمینوترانسفراز، ادرار دردناک، مشکلات عصبی.

### شرایط نگهداری دارو:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور مستقیم، رطوبت و یخ زدگی باشد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مصرف داروی آمیوگر تاریخ گذشته خودداری شود.

### بسته بندی:

هر پلیستر شفاف شامل ۱۰ قرص دایره ای میباشد و در هر جعبه دارو ۲۰ قرص قرار دارد.

### شرکت تولید کننده:

شرکت داروسازی هوگر دارو دانش ،  
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی  
تهران ، ایران کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱  
www.hogerdaroo.com

size: 15\*7mm

هوگر دارو  
شرکت دارویی سهامی خاص

